

Peel Concept.

Primera y única línea
de ácidos faciales
registrada
por el M.S.P.

GUÍA DE USO

CONTENIDO

01 / Guía de uso seguro
Contraindicaciones
Cuidados post peeling

02 / Preparación previa de la piel

03 / Tabla resumen de tratamientos

04 / Procedimientos faciales
ROSÁCEA Y PIEL SENSIBLE
• Rosácea
Mandélico 35% + Azelaico 20%

HIDRATACIÓN
• Pieles deshidratadas
Ácido Láctico 45%

MANCHAS / HIPERPIGMENTACIÓN
• Melasma:
Azelaico 20%

TRATAMIENTO CORPORAL
• Estrías:
TCA 15%

ACNÉ
• Cicatrices de acné:
TCA 15%
• Acné inflamatorio leve:
Mandélico 35%

ANTIAGE
• Antiage piel sensible:
Azelaico 20% + Mandélico 35%
• Antiage glicólico:
Ácido Glicólico 30%–50%



01 / GUÍA DE USO SEGURO

- Uso profesional o bajo indicación especializada.
- Realizar test de sensibilidad previo al tratamiento.
- No aplicar sobre piel irritada, lesionada o infectada.
- Evitar contacto con ojos y mucosas.
- Suspender ante irritación intensa.
- Uso recomendado de protector solar posterior al tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

- Embarazo o lactancia
- Infecciones cutáneas activas
- Piel sensibilizada o lesionada
- Hipersensibilidad a los componentes

CUIDADOS POST PEELING

- Evitar exposición solar directa
- Usar fotoprotección alta
- No retirar descamación manualmente
- Mantener hidratación de la piel

02 / PREPARACIÓN PREVIA DE LA PIEL

- Limpiar con agua
- Desengrasar con alcohol 70%
- Proteger zonas sensibles con vaselina
- Cubrir ojos

03 / TABLA RÁPIDA DE TRATAMIENTOS

INDICACIÓN	ÁCIDOS	TIEMPO
Rosácea	Mandélico 35% + Azelaico 20%	5–10 min
Piel deshidratada	Láctico 45%	5 min
Estrías	TCA 15%	2-3 min
Cicatrices de acné	TCA 15%	2-3 min
Acné inflamatorio leve	Mandélico 35%	5–10 min
Melasma	Azelaico 20%	5-10 min
Antiage piel sensible	Mandélico 35% + Azelaico 20%	5-10 min
Antiage glicólico	Glicólico 30–50%	5–10 min

04 / PROCEDIMIENTOS FACIALES

Rosácea / **ÁCIDO MANDÉLICO 35% / ÁCIDO AZELÁICO 20%**

Indicación:
Rosácea y piel con hiperpigmentación asociada.
Activos: Ácido Mandélico 35% + Ácido Azelaico 20%

Procedimiento:
- Realizar protocolo de preparación de la piel.
- Aplicar Ácido Mandélico 35% de forma homogénea desde zonas más resistentes hacia las más sensibles.
- Aplicar Ácido Azelaico 20% en zonas hiperpigmentadas.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos según tolerancia.
- Enjuagar con agua.

Se recomienda realizar entre 8 y 10 sesiones cada 15 días, según criterio médico.

Nota: Suspender el uso de ácido retinoico, sus derivados y AHA al menos 72 horas antes.



ÁCIDO MANDÉLICO **35%** — **pH 2.5**
ÁCIDO AZELAICO **20%** — **pH 3.5**

REQUIEREN NEUTRALIZACIÓN FINAL
5 a 10 minutos

Pieles deshidratadas / **ÁCIDO LÁCTICO 45%**

Indicación: Pieles deshidratadas
Activos: Ácido Láctico 45%

Procedimiento:
- Realizar protocolo de preparación de la piel.
- Aplicar Ácido Láctico 45%.
- Dejar actuar 5 minutos.
- Enjuagar con agua.

Se recomienda realizar entre 5 y 8 sesiones con intervalos de 7 a 15 días, según tolerancia.

Nota: Suspender el uso de ácido retinoico, sus derivados y AHA al menos 72 horas antes.



ÁCIDO LÁCTICO **45%** — **pH 1.0**

REQUIERE NEUTRALIZACIÓN FINAL
5 minutos

Estrías / **TCA 15%**

Indicación: Estrías
Activos: TCA 15%

Procedimiento:
- Realizar protocolo de preparación de la piel.
- Aplicar TCA 15% estría por estría con movimientos circulares.
- Esperar entre 2 y 3 minutos.
- Si no se observa frosting, repetir aplicación según criterio profesional.
- Enjuagar con agua.

Opcional: Aplicar compresas frías.

Plano de acción del TCA según respuesta cutánea
Eritema intenso: epidermis superficial (10–20%).
Rosa claro: epidermis profunda hasta membrana basal (25–35%).
Blanco nube: dermis papilar superior (40–50%).
Blanco uniforme: dermis reticular (>50%).

Nota: Suspender el uso de retinoides y alfahidroxiácidos 7 días antes.



TCA **15%** — **pH 0.5**

NO REQUIERE NEUTRALIZACIÓN FINAL
2 a 3 minutos

04 / PROCEDIMIENTOS FACIALES

Cicatrices de acné / **TCA 15%**

Indicación: Acné
Activos: TCA 15%

Procedimiento:
• Realizar protocolo de preparación de la piel.
• Aplicar TCA 15% Peel Concept con gasa 2 × 2 cm, desde la línea media hacia ambos lados de la frente y sobre la nariz. Al lograr blanqueamiento uniforme, neutralizar en el mismo orden y enjuagar con agua a temperatura ambiente. Aplicar compresas frías si es necesario.
• Segunda aplicación: 2–3 mm por debajo del ojo izquierdo, cubriendo mejilla izquierda y área perioral. Observar, neutralizar y enjuagar.
• Tercera aplicación: por debajo del ojo derecho, cubriendo toda la mejilla derecha. Neutralizar y enjuagar.

Nota: Suspender el uso de retinoides y alfahidroxiácidos 7 días antes.



TCA
15%
pH 0.5

REQUIERE NEUTRALIZACIÓN FINAL | **2 a 3 minutos**

Acné inflamatorio leve / **ÁCIDO MANDÉLICO 35%**

Indicación: Acné inflamatorio leve
Activos: Ácido Mandélico 35%

Procedimiento
• Realizar protocolo de preparación de la piel.
• Aplicar de forma homogénea desde las zonas más resistentes.
• Dejar actuar entre 5 y 10 minutos o hasta eritema o frosting.
• Enjuagar con abundante agua sin frotar la piel.

Nota: Suspender el uso de retinoides, sus derivados y agentes queratolíticos al menos 72 horas antes.



ÁCIDO
MANDÉLICO 35%
pH 2.5

REQUIERE NEUTRALIZACIÓN FINAL | **5 a 10 minutos**

Melasma / **ÁCIDO AZELAICO 20%**

Indicación: Melasma
Activos: Ácido Azelaico 20%

Procedimiento:
• Realizar protocolo de preparación de la piel.
• Aplicar de forma homogénea desde zonas más resistentes a más sensibles.
• Incrementar progresivamente según tolerancia.
• Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
• Enjuagar con abundante agua.
Se recomienda realizar entre 8 y 10 sesiones cada 15 días, según criterio médico.

Nota: Suspender el uso de ácido retinoico, sus derivados y AHA al menos 72 horas antes.



ÁCIDO
AZELAICO 20%
pH 3.5

REQUIERE NEUTRALIZACIÓN FINAL | **5 a 10 minutos**

04 / PROCEDIMIENTOS FACIALES

Antiage piel sensible / **ÁCIDO MANDÉLICO 35% + ÁCIDO AZELÁICO 20%**

Indicación: Antiage piel sensible
Activos: Ácido Mandélico 35% + Ácido Azelaico 20%

Procedimiento:
- Realizar protocolo de preparación de la piel.
- Aplicar de forma homogénea desde zonas más resistentes a más sensibles.
- Dejar actuar 5 a 10 minutos según tolerancia.
- Enjuagar con agua.

Se recomienda realizar entre 8 y 10 sesiones cada 10 o 15 días, según criterio médico.

Nota: Suspender el uso de ácido retinoico, sus derivados y AHA al menos 72 horas antes.



ÁCIDO MANDÉLICO **35%** — **pH 2.5**
ÁCIDO AZELAICO **20%** — **pH 3.5**

REQUIEREN NEUTRALIZACIÓN FINAL

5 a 10 minutos

Antiage glicólico / **ÁCIDO GLICÓLICO 30% - 50%**

Indicación: Tratamiento antiage
Activos: Ácido Glicólico 30% - 50%

Procedimiento:
- Realizar protocolo de preparación de la piel.
- Aplicar el ácido en toda la cara en 15–20 segundos.
- Comenzar por zonas menos sensibles.
- Dejar actuar entre 5 y 10 minutos según concentración y tolerancia.
- Enjuagar con agua.

Se recomienda realizar entre 8 y 10 sesiones cada 15 a 20 días, según la concentración del ácido utilizado.

Nota: Suspender el uso de ácido retinoico, sus derivados y AHA al menos 72 horas antes.



ÁCIDO GLICÓLICO **30%** — **pH 1.1**
ÁCIDO GLICÓLICO **50%** — **pH 0.8**

REQUIEREN NEUTRALIZACIÓN FINAL

5 a 10 minutos

Iniciar las aplicaciones de forma progresiva, según la máxima tolerancia, utilizando una u otra concentración.



PRIMERA Y ÚNICA LÍNEA DE ÁCIDOS FACIALES REGISTRADA POR EL M.S.P.
Garantía de estandarización de fabricación